



# จระเข้ อีซี่ น้ำยากันพื้นลื่นห้องน้ำ

## Jorakay Easy Bathroom Anti Slip



สร้างความฝืดเมื่อกระเบื้องเปียกน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ได้กับพื้นกระเบื้องโดยเฉพาะ ยกเว้นกระเบื้องเคลือบแก้ว ไร้สารตกค้าง ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร หรือบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการลื่นล้ม เช่น ระเบียง หรือ พื้นในห้องน้ำ

### คุณสมบัติเด่น

- สามารถใช้ได้กับพื้นกระเบื้องทุกชนิด ยกเว้นกระเบื้อง เคลือบแก้ว
- กันพื้นลื่น ได้มาตรฐาน DCOF เทียบเคียงกระเบื้อง R11 ขึ้นไป
- ประสิทธิภาพยาวนานนับปี

### ข้อแนะนำการใช้

ควรทำความสะอาดพื้นอย่างสม่ำเสมอ เพราะพื้นอาจ กลับมาลื่นด้วยคราบสบู่, แชมพู หรือคราบสกปรกอื่นๆ ที่เกิดขึ้นภายหลัง ยังทำความสะอาด ความฝืดยังอยู่ได้ นานขึ้น

### การใช้งาน

1. ควรทดสอบบริเวณเล็กๆ ก่อน
  2. เทน้ำยาจระเข้ อีซี่ กันพื้นลื่น ลงบนฟองน้ำเท่านั้น แล้วค่อยๆ เช็ดโลมให้ทั่วบริเวณที่ต้องการ
  3. รอ 45-60 นาที (น้ำยาต้องชุ่มอยู่ตลอดเวลา 45 นาที)
  - หากมีบางส่วนแห้งให้เช็ดโลมซ้ำ
  4. เมื่อครบเวลาจึงล้างออกด้วยน้ำเปล่า ประสิทธิภาพของน้ำยาก็จะสมบูรณ์
  5. หมั่นทดสอบอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย 6 เดือน/ครั้ง
- หากพบว่าประสิทธิภาพกันลื่นลดลง ให้ทำซ้ำอีกครั้ง (รับรองผลเฉลี่ย 6 เดือน)

### พื้นที่ใช้งาน

โดยประมาณ 5 ตรม.



### สารประกอบสำคัญ

- Phosphoric Acid 3-5%
- Ammonium Bifluoride 1-3%
- Alcohol C9-11 Ethoxilate 1-2%

### ข้อควรระวัง

- ควรทดสอบประสิทธิภาพในพื้นที่เล็กๆ ก่อน
- สวมถุงมือและแว่นป้องกันตลอดเวลา และควร หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง
- สีของกระเบื้อง และความมันวาวอาจลดลงเล็กน้อย เนื่องจากปฏิกิริยาทางเคมีของ น้ำยาจะเซ็ กันพื้นลื่น อาจทำให้กระเบื้องที่มีสีเข้ม เช่น สีดำ หรือสีน้ำเงินแก่ อาจจางลง (ควรทดสอบก่อนว่าผลที่ได้เป็นที่พอใจหรือไม่) แต่การกันพื้นลื่นยังคงให้ประสิทธิภาพ เหมือนเดิม
- ไม่ควรเทน้ำยาจะเซ็ กันพื้นลื่น ลงบนกระเบื้อง โดยตรง เด็ดขาด จะต้องเทลงบนฟองน้ำ แล้วใช้ฟองน้ำทาลง บนพื้นผิวเท่านั้น

### การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

- ทางกรเข้าตา ล้างตาด้วยน้ำเปล่าจำนวนมากทันที และกรอกตาขึ้นลง หากใส่คอนแทคเลนส์ ควรถอดอย่าง ระมัดระวัง และล้างตาด้วยน้ำเปล่าอย่างน้อย 20 นาที และควรปรึกษาแพทย์
- ทางกรสูดดม เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่โล่งและอากาศ ถ่ายเท หากยังมีควันฟุ้งจากสารเคมี ควรสวมใส่หน้ากาก ในกรณีหมดสติ ควรจัดทำทางผู้ป่วยอยู่ในท่าที่เหมาะสม  
ปลดกระดุมเสื้อหรือเนคไทด์ ควรเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไป ในสถานที่ปลอดโปร่ง อากาศถ่ายเท และปรึกษาแพทย์ฉุกเฉินทันที
- ทางกรผิวหนัง ล้างสิ่งปนเปื้อนจากผิวหนังด้วยน้ำจำนวนมาก ล้างสารที่ปนเปื้อนเสื้อผ้าด้วยน้ำ และควรสวมถุงมือ ควรล้างน้ำเป็นระยะเวลา 20 นาที ซักเสื้อผ้าและรองเท้านำมาสวมใส่
- ทางกรปาก ถอดฟันปลอมหากมี และดื่มน้ำตาม ในปริมาณพอสมควร และควรหยุดหากผู้ป่วยมีอาการอยากอาเจียน หากผู้ป่วยมีอาการอาเจียน ควรจัดทำให้ ศีรษะอยู่ต่ำ เพื่อป้องกันไม่ให้สารพิษเข้าสู่ปอด ไม่ควรนำสิ่งต่างๆ ใส่ปากผู้ป่วย หากผู้ป่วยมีอาการหมดสติ ควรเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่อากาศปลอดโปร่งและถ่ายเทปลดกระดุมเสื้อ และปรึกษาแพทย์ฉุกเฉินทันที

### การเก็บรักษา

เก็บในที่มืดซิด ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง ควรจัดเก็บให้พ้นแสงแดด สามารถจัดเก็บที่อุณหภูมิห้อง

### การบรรจุ

220 มล. / ขวด

ข้อมูลที่ระบุในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้เนื่องจากได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและมาจากประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ บริษัทฯ ซึ่งเก็บข้อมูลในขณะที่ผลิตภัณฑ์จัดเก็บอยู่ในภาวะที่เหมาะสม มีการใช้งานผลิตภัณฑ์ในสภาพปกติและอยู่ภายใต้คำแนะนำของ บริษัทฯ คำแนะนำในเอกสารฉบับนี้เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานและช่วยแก้ไขปัญหเบื้องต้นในการใช้งานแต่ไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้งานที่ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์หรือพยายามดัดแปลงผลิตภัณฑ์เพื่อความต้องการส่วนบุคคล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ผลิตภัณฑ์ หรือ การใช้งานของผลิตภัณฑ์โดยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ถือเป็นข้อมูลที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงล่าสุดและข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับเดิมถือเป็นโมฆะ